

Intolérance aux excipients

à effets notoires



Pas à pas réalisé par gilles guillon. Juillet 2011

N'engage en rien Prokov Editions

Merci aux correcteurs : P.Blavier, G. Hamonic, B. Mullie, D. Parez

Si questions relatives à ce livret : courriel : pasapas@laposte.net

Comment

afficher sur l'ordonnance du patient

un message d'information

relatif à son intolérance aux excipients à effet notoire ?



Docteur Jean MARTIN	Le19/01/2011
Médecine Générale Lauréat de la Faculté de ----- Consultations de 9 h à 12 h ----- 25, Rue des Roses 75000 PARIS Tél. 00 00 00 0000	Mademoiselle z
	Excipient SANS : SULFITES

Le nombre de patients concernés par les intolérances aux excipients à effet notoire est probablement faible.

Mais, à la suite des diverses formations FMC dont le sujet traitait "Prescription en DC", il est apparu une demande de prise en compte de cette éventualité.

Pour répondre au mieux aux utilisateurs de MS l'ayant souhaité, voici un pas à pas relatif à la mise en place d'un message systématique sur l'ordonnnance.

Sommaire

"Qui pro quo" et droit de substitution	5
Excipient à effet notoire : Prudence : pourquoi ?	6
Méthodologie	8
Création de la rubrique	9
Création de la zone de report sur l'ordonnance	12
Utilisation sans le dossier de santé	15
Contrôles de l'ordonnance	17
Quelques exemples en vrac	19
Remerciements aux correcteurs	21



"Qui pro quo" : 7 siècles de résistance ...



1271 : Philippe III le hardi
Pas d'ordonnance écrite, mais
verbale à l'officine et
Interdiction du "qui pro quo" *

** cf le diaporama : "histoire de l'ordonnance"*

Bernard Kouchner : 1999
"DROIT de substitution"
par le pharmacien sans
l'accord du prescripteur



Prudence : pourquoi ?



Princeps avec "nom de fantaisie"

substituable

DELIVRANCE =
médicament générique
ou
autre "nom de fantaisie"

excipients différents
selon le produit substitué à la
prescription initiale

= **RISQUE** d'excipients à effet notoire.

Prescription en D.C.

DELIVRANCE =
Spécialité avec "nom de fantaisie"
ou d'un médicament générique

= **RISQUE**
excipients à effet notoire
selon les différents équivalents
thérapeutiques délivrés.

Informez le pharmacien sur l'ordonnance



Il est NECESSAIRE d'informer le pharmacien
en cas d'intolérance par le patient
à un excipient à effet notoire,
afin que la délivrance du traitement se fasse en toute connaissance de cause.



Pour ce,
l'indication sur l'ordonnance est incontournable.

Les pages suivantes décrivent un automatisme de report de ces intolérances éventuelles sur l'ordonnance.

*nb : ce message apparaîtra sur toutes les ordonnances (pharmacien, kiné, LABM)
à moins d'utiliser des formats différents dont le choix est effectué avant l'impression.*



Méthodologie :

- ◇ Créer une rubrique d'intolérance en bas de la fiche d'identité
- ◇ Créer une zone dédiée sur le format d'ordonnance
- ◇ Affecter un report de cette rubrique d'intolérance dans la zone dédiée
- ◇ Cette zone restera invisible si le dossier ne comporte pas cette rubrique
(patient sans intolérance connue)





Création de la rubrique

La rubrique sera installée :

- dossier par dossier uniquement de "patient intolérant"
- **JAMAIS** sur l'ensemble des dossiers (*sans intérêt*)
- devra comporter un titre ET un contenu

Mais pour 3 raisons le confort est de passer par un modèle de dossier.

Création du modèle :


- Menu dossier

2^o ligne : Nouveau dossier...

et non pas la 1^o ligne


Dossier	Édition	Format	Options
Nouveau dossier			⌘N
Nouveau dossier...			⇧⌘N
Ouvrir un dossier			⌘O

- Sélectionner éventuellement dans la colonne à gauche le fichier concerné
- Choisir dans la colonne à droite **obligatoirement la première ligne** : "Patient"




Clic en bas à droite sur le bouton : [Ajouter]

= volet de dialogue



Taper le titre de la nouvelle rubrique


ATTENTION : c'est précisément CE titre qui devra être reporté plus loin dans le format d'ordonnance (*Majuscule, accent et espace compris*)



Lorsque la rédaction du titre est terminée :

sélectionner et copier le texte (trefle + C) pour le coller lors de la 5^e étape page 13

Clic bouton [Créer]




La rubrique est maintenant créée



The screenshot shows a software window with a title bar. Inside, there's a text input field containing "Intolérance excipient à effet notoire". To the right of this field is a vertical toolbar with three buttons: "Ajouter", "Modifier", and "Supprimer". Above these buttons is the label "Rubriques".

Compléter immédiatement son contenu par "Excipient SANS : " (ou autre formulation à votre convenance)




This screenshot shows the same software window as before, but the text input field now contains "Intolérance excipient à effet notoire" followed by "Excipient SANS : ". The text "Excipient SANS : " is highlighted with a blue selection box.

Puis : Menu Dossier / Modèle / Créer un modèle



Titrer précisément



The screenshot shows a dialog box titled "Créer un modèle de dossier". It contains the following text: "Le modèle conserve les rubriques et l'organisation du dossier. Choisi à la création d'un dossier, il lui donne sa structure. Appliqué à un dossier existant, il lui superpose ses propriétés." Below this text is a label "Nom du modèle :" followed by a text input field containing "Excipient effet notoire (Rubrique)". A dropdown arrow is visible on the right side of the input field.

Clic bouton [Enregistrer]



Fermer le dossier en cours intitulé : "Sans identité" sans l'enregistrer.



Création de la zone de report sur l'ordonnance


Menu Options / Adapter les formats d'impression / Choisir si nécessaire le fichier

Clic sur le bouton [Formats] et sélectionner le format d'ordonnance

= vue d'ensemble de la mise en page

- Clic à gauche sur l'outil Texte [A] puis dessiner une diagonale sur l'écran

= zone rectangulaire



Menu Edition / Insérer un report

Insérer un report...



Choisir et renseigner comme ci-dessous :



NB : le texte de la rubrique
doit être précisément celui
créé plus haut
(d'où l'intérêt d'avoir effectué
un "Copier" auquel cas il suffit
d'appliquer un "Coller"
(ou trèfle+V)
Ainsi pas de faute de frappe !

Clic bouton [Insérer]

Insérer

Avec les adaptations de : Patients GG

Général Documents Autres

Reporter le champ ou l'information :

Patient	Profil en alerte
Patient	Profil actif en alerte
Patient	Présélections
Patient	Divers 1
Patient	Divers 2
Patient	Téléphone
Patient	Rubrique
Dossier	Variable de biométrie
Dossier	Agrégation de valeurs récentes
Dossier	Synthèse
Dossier	Lien

Rubrique : Intolérance excipient à effet notoire

Intolérance à effet notoire Excipient SANS :

Insérer et continuer Fermer Insérer

Le mot "rubrique" prend sa place dans la zone de report

The diagram illustrates a medical prescription form layout. On the left, a vertical sidebar contains five icons: a mouse cursor, a text box with a blue 'A', a hash symbol in a dashed box, a medicine bottle, and a rectangular selection box. A blue arrow points from the selection box icon to the main content area. The main content area is divided into several sections: a top header for 'Docteur Jean MARTIN' and 'Le <Date du jour>'; a central box for the doctor's details including 'Médecine Générale', 'Lauréat de la Faculté de', 'Consultations de 9 h à 12 h', and the address '25, Rue des Roses, 75000 PARIS'; a box for patient information with placeholders '<Titre de politesse>', '<Prénom>', and '<Nom>'; a box for the prescription with the placeholder '<Rubrique>' highlighted by a blue border; and a footer section with the text 'Duplicata ne permettant pas la délivrance de médicaments' and 'Texte à imprimer'.

Ne pas oublier de définir la zone suffisamment large en largeur et en hauteur pour ne pas risquer de tronquer le texte reporté.

Si besoin : double-clic sur le mot report <Rubrique> = sélection
et enrichir en gras (trèfle+B) ou italique (trèfle+I), ou couleur, etc.

Avec l'outil adéquat (flèche à gauche) : positionner correctement la zone de report
Ne pas oublier d'en faire de même sur la page à droite de l'écran
ou plus facile : en gardant enfoncées les touches ALT+Trèfle
clic sur la zone "Rubrique" de la page à gauche
= report exactement au même endroit sur la page à droite

Fermer la fenêtre et valider l'enregistrement des modifications.



Utilisation = insertion de la rubrique dans un dossier patient

Ouvrir le dossier patient

Afficher la fenêtre d'identité


Menu Dossier / Modèle / Appliquer un modèle...



Sélectionner le modèle créé plus haut
(d'où l'intérêt d'un titre évocateur)

Clic le carré "Compléter ..."
(nécessaire pour le report du modèle dans le dossier)


Clic bouton [Appliquer]



La rubrique prend sa place sur la fenêtre "Identité" du dossier de santé


nb : si la rubrique n'apparaît pas :

reprendre l'étape précédente et ne pas oublier de cocher "Compléter"



Intolérance excipient à effet notoire Excipient SANS :

Renseigner maintenant le contenu de la rubrique
en la complétant en fonction de l'intolérance du patient



Intolérance excipient à effet notoire Excipient SANS : SULFITES

Rubriques

Ajouter

Modifier

Supprimer



Contrôle sur l'ordonnance

Le contenu de la rubrique n'est reporté sur l'ordonnance que si deux conditions sont remplies :
la rubrique existe ET elle est renseignée.

Sinon rien n'apparaît.

Docteur Jean MARTIN	Le19/01/2011
Médecine Générale Lauréat de la Faculté de ----- Consultations de 9 h à 12 h ----- 25, Rue des Roses 75000 PARIS Tél. 00 00 00 0000	Mademoiselle z
	Excipient SANS : SULFITES



Derniers contrôles

- A) ne pas oublier de reporter cette rubrique par un simple "Copier/Coller" de la zone sur TOUS les types d'ordonnances utilisés :
avec dupli, sans dupli, ADL, format A5 écologique, etc.
sauf/et (si les formats existent) : ceux destinés aux infirmières, kiné, radiologues, LABM

nb : si un seul format utilisé = cette méthode reporte l'information pour tous les destinataires

- B) Sur un dossier fictif :
contrôler pour chaque format que le report s'effectue correctement
ceci à cause d'une faute de frappe possible sur le réglage de report

- C) En cas de fichiers multiples, recommencer la même procédure pour chacun d'entre eux.
Le "Copier/Coller" fonctionne également

> Le désespoir est à la mort ce que le beurre de cacao est au suppositoire : un **excipient** qui rend plus facile le passage.

[Philippe Bouvard]





Quelques exemples en vrac...
et liste des excipients à effet notoire

Sulfite / Anh. sulf :
Solupred 5 ® = NON
Prednisolone = OUI

Lactose :
Ténormine® = NON
Aténolol (tous) = OUI

Lactose :
Serc 8 ® = NON
Bétahistine 8 Arrow = OUI
Bétahistine 8 EG = OUI
Bétahistine 8 Biphar = NON
Bétahistine 8 Mylan = NON

Gluten :
Zeclar® susp 25mg/ml = NON
Clarithromycine susp 25mg/ml SDZ = OUI

Huile d'arachide :
Spasmopriv/Duspatalin ® = NON
Mébéverine Zydus = NON
Mébéverine Teva / Mylan = OUI

Sulfite :
Feldene gelule® = OUI
Piroxicam Pfizer = OUI
Piroxicam (génériques) = NON

Paraben :
Zyloric® = NON
Allopurinol = OUI

EXCIPIENT 1 : APROTININE
EXCIPIENT 2 : HUILE D'ARACHIDE EXCIPIENT
EXCIPIENT 3 : ASPARTAM (E951)
EXCIPIENT 4 : COLORANTS AZOÏQUES
EXCIPIENT 5 : BAUME DU PÉROU
EXCIPIENT 6 : CHLORURE DE BENZALKONIUM
EXCIPIENT 7 : ACIDE BENZOÏQUE ET BENZOATES
EXCIPIENT 8 : ALCOOL BENZYLIQUE
EXCIPIENT 9 : HUILE DE BERGAMOTE BERGAPTÈNE
EXCIPIENT 10 : BRONOPOL
EXCIPIENT 11 : HYDROXYANISOLE BUTYLÉ (E320)
EXCIPIENT 12 : HYDROXYTOLUÈNE BUTYLÉ (E321)
EXCIPIENT 13 : HUILE DE RICIN POLYOXYL ET HUILE DE RICIN POLYOXYL HYDROGÉNÉE
EXCIPIENT 14 : ALCOOL CÉTOSTÉARYLIQUE Y COMPRIS ALCOOL CÉTYLIQUE
EXCIPIENT 15 : CHLOROCRÉSOL
EXCIPIENT 16 : DIMÉTHYL SULFOXYDE.
EXCIPIENT 17 : ETHANOL
EXCIPIENT 18 : FORMALDÉHYDE
EXCIPIENT 19 : <i>FRUCTOSE</i>
EXCIPIENT 20 : <i>GALACTOSE</i>
EXCIPIENT 21 : <i>GLUCOSE</i>
EXCIPIENT 22 : GLYCÉROL
EXCIPIENT 23 : HÉPARINE (EN TANT QU'EXCIPIENT)
EXCIPIENT 24 : <i>SIROP DE GLUCOSE HYDROGÉNÉ (OU MALTITOL LIQUIDE)</i>
EXCIPIENT 25 : <i>SUCRE INVERTI</i>
EXCIPIENT 26 : <i>LACTITOL, E966</i>
EXCIPIENT 27 : <i>LACTOSE</i>

EXCIPIENT 28 : LANOLINE (GRAISSE DE LAINE)
EXCIPIENT 29 : LATEX CAOUTCHOUC NATUREL (LATEX)
EXCIPIENT 30 : <i>MALTITOL E965 ET ISOMALTITOL E953, MALTITOL LIQUIDE (VOIR SIROP DE GLUCOSE HYDROGÉNÉ)</i>
EXCIPIENT 31 : MANNITOL, E421
EXCIPIENT 32 : COMPOSÉS ORGANOMERCURIELS
EXCIPIENT 33 : PARAHYDROXYBENZOATES ET LEURS ESTERS
EXCIPIENT 34 : PHÉNYLALANINE
EXCIPIENT 35 : POTASSIUM
EXCIPIENT 36 : PROPYLÈNE GLYCOL ET ESTERS
EXCIPIENT 37 : HUILE DE SÉSAME
EXCIPIENT 38 : SODIUM
EXCIPIENT 39 : ACIDE SORBIQUE ET SELS
EXCIPIENT 40 : <i>SORBITOL E420</i>
EXCIPIENT 41 : HUILE DE SOJA (ET HUILE DE SOJA HYDROGÉNÉE)
EXCIPIENT 42 : ALCOOL STÉARYLIQUE
EXCIPIENT 43 : <i>SACCHAROSE</i>
EXCIPIENT 44 : SULFITES, Y COMPRIS MÉTABISULFITES
EXCIPIENT 45 : AMIDON DE BLÉ
EXCIPIENT 46 : GRAISSE DE LAINE : VOIR LANOLINE
EXCIPIENT 47 : <i>XYLITOL</i>

“Le désespoir est à la mort ce que le beurre de cacao est au suppositoire : un **excipient** qui rend plus facile le passage.”

[Philippe Bouvard]



Pierre Blavier



Gérard Hamonic



Encore merci
aux correcteurs fidèles...



Bernard Mullié



Didier Parez